FICHE PRODUIT

SOIN CONIFÈRES ANTI-BRUNISSEMENT

Liquide concentré

Lutte contre les carences responsables du brunissement de tous les conifères : pins, sapins, thuyas, épicéas, cèdres, cyprès, chamaecyparis, troènes entre autres.

- ✓ **Une solution anti-carentielle contre le brunissement des conifères.**
- ✓ **Corrige les carences responsables du brunissement des conifères grâce à un apport de Fer, Magnésium et Manganèse.**
- ✓ **Action préventive et curative.**

Fabriqué en France

Composition	**ENGRAIS CE** : Solution de sulfate de magnésium contenant du Fer (Fe) et du Manganèse (Mn). • 5 % d'oxyde de magnésium (MgO), soluble dans l'eau. • 10 % d'anhydride sulfurique (SO3), soluble dans l'eau. • 0,45 % fer (Fer) chélaté par DTPA, soluble dans l'eau • 0,15 % manganèse (Mn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau.
Formulation	Liquide concentré
Type d'action	Anti-carentiel
Usages	Espèces végétales

MODE D'ACTION

- Les carences des conifères sont généralement reconnaissables au jaunissement/brunissement progressif des extrémités des aiguilles.
- Le Soin Conifères de FERTILIGÈNE vient couvrir les besoins nutritionnels essentiels à la croissance des conifères en pleine terre ou en pots :
  - Fer (Fe)
  - Manganèse (Mn)
  - Magnésium (Mg)

Carences des conifères

FORMAT DISPONIBLE À LA VENTE

CARTONS

Nom	Références	Format	Unités/ carton
Soin conifères anti-brunissement	FBRUCO	500 ml	12

SCOTTS FRANCE SAS - 21 chemin de la Sauvegarde - 69130 ÉCULLY - RCS Lyon 830 854 006.

LA PAUSE JARDIN.FR

FICHE PRODUIT

SOIN CONIFÈRES ANTI-BRUNISSEMENT

Liquide concentré

Fertiligène

Fabriqué en France

COMMENT L'UTILISER ?

En pulvérisation : 15 ml dans un litre d'eau

- Verser la dose dans un pulvérisateur avec un peu d'eau.
- Agiter, puis compléter avec la dose d'eau nécessaire.
- **Appliquer en prenant soin de bien mouiller l'ensemble du conifère.**
- Effectuer au maximum 1 application par semaine, pendant 3 semaines.

En arrosage : de 25 à 50 ml dans 2 à 4 litres d'eau

- La solution s'applique sur la surface du sol occupée par les racines des plantes. Aussitôt l'application effectuée, arroser abondamment en apportant 15 à 20 litres d'eau par m^2 pour faire descendre le produit au niveau des racines.

QUAND L'UTILISER ?

- De mars à octobre.
- **En préventif :** sur cultures pérennes, répandre la solution le plus près possible de la zone d'absorption des racines avant la reprise de la végétation au printemps.
- **En curatif :** appliquer dès le jaunissement des feuilles. Si les symptômes persistent après 2 semaines, appliquer une nouvelle fois.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Période idéale

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ce produit contient du fer et peut provoquer des tâches sur les vêtements, dalles, etc…
- Ne pas confondre : les symptômes des carences sont très proches de maladies cryptogamiques (dues à des champignons) dont le brunissement de branches est complet. Dans ce cas, un traitement fongicide sera plus approprié.

LE BON CONSEIL

- Les arbustes, même après plantation ont besoin de se nourrir.
- Des apports d'engrais confères permettront de favoriser leur croissance et leur vigueur vis à vis de maladies fongiques ou d'accidents physiologiques (gel, froid, chaleur, etc...).

SCOTTS FRANCE SAS - 21 chemin de la Sauvegarde - 69130 ÉCULLY - RCS Lyon 830 854 006.

LA PAUSE JARDIN.FR